



CASE ȘI GRĂDINI PROTEJATE ÎMPOTRIVA OASPETILOR NEDORIȚI

CERCETARE ȘI PRODUCȚIE DE RODENTICIDE, INSECTICIDE ȘI PRODUSE PENTRU
PROTECȚIA CULTURILOR DE PLANTE





MISIUNEA NOASTRĂ Obiectivul principal al companiei, împărtășit și urmărit de întreaga echipă, este satisfacerea așteptărilor partenerilor noștri în cel mai eficient mod posibil, în deplin respect față de mediul înconjurător.

VIZIUNEA NOASTRĂ Suntem pe deplin conștienți de oportunitățile și avantajele oferite de administrarea echilibrată și responsabilă a resurselor naturale, ținând cont nu doar de aspectele economice, ci și de cele ecologice și sociale. Obiectivul VEBI este desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare a unor produse cât se poate de eficiente și în același timp cât mai puțin nocive posibil.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ Dorința noastră este aceea de a contribui, prin fiecare acțiune realizată, la construirea unei atitudini prietenoase față de mediul înconjurător la nivel social, care să contribuie în mod decisiv la îmbunătățirea bunăstării colective. Ne-am luat angajamentul de a implementa tehnici de producție responsabile, conforme tuturor legilor sau liniilor directoare privind mediul înconjurător.

Este absolut necesară instruirea utilizatorilor cu privire la modul de folosire a produselor noastre astfel încât să se obțină eficiență maximă concomitent cu reducerea impactului ecologic al acestora.

Institutul Biochimic Vebi își începe activitatea în industria farmaceutică în anul 1944. De-a lungul anilor, vasta experiență în sectorul compușilor chimici a contribuit decisiv la specializarea în sectorul substanțelor chimice cu activitate biologică.

PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ

Specializare în producția de rodenticide, insecticide, produse pentru protecția culturilor de plante, substanțe repelente și fertilizanți cu diverse formule și substanțe active. Atenția deosebită pe parcursul întregului proces de producție și verificarea periodică a calității materiilor prime garantează comercializarea unor produse de cea mai înaltă calitate.

VÂNZĂRI ȘI MARKETING

Institutul Biochimic Vebi a dezvoltat rețele de desfacere în mai mult de 40 de țări, exportându-și produsele în Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Americile de Nord și de Sud. Distribuția produselor are loc atât în magazine de specialitate cât și în centre comerciale bucurându-se de un suport tehnic și comercial constant din partea colaboratorilor.

DEPARTAMENTUL DE ÎNREGISTRARE

Misiunea departamentului nostru de reglementare este introducerea și comercializarea de noi produse / formule în diverse țări.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

VEBI este implicată în mod constant în activități de cercetare și dezvoltare menite să răspundă prompt schimbărilor de mediu.

Un grup de experți tehnici se dedică exclusiv cercetării și dezvoltării de noi formule, acordând o atenție deosebită atât calității cât și eficienței produselor fără a pierde din vedere protecția mediului înconjurător.

Realizăm periodic teste de laborator specifice pentru a garanta calitatea produselor în ceea ce privește eficacitatea, atractivitatea și durabilitatea acestora.

RODENTICIDE

4

Informații tehnice

9

Tipuri de forme

16

Stații de intoxicare

INDEX

INSECTICIDE

20

Tehnologie de micoîncapsulare

22

Forme

27

Capcane ecologice cu adeziv

28

REPELENȚI

CASE
ȘI GRĂDINI
PROTEJATE
ÎMPOTRIVA
OASPETILOR
NEDORIȚI

În conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă vor fi aplicate în afara razei de acțiune a copiiiilor, animalelor domestice sau sălbatice. Momeala v-a fi asezată de-a lungul traseului între sursele de hrană și ascunzătorile lor.

Vor fi așezate de-a lungul traseului lor între sursele de hrană și ascunzătorile lor.

Vor fi așezate lângă pereți verticali.


Locurile cele mai bune sunt acelea unde se văd cele mai multe excremente.

Ideal este să așezați momeala în stații de intoxicare sau în locuri ascunse, sub mobilă sau țevi.

Înainte de a plasa momeala, dacă este posibil, eliminați sursele de hrană alternative.

Înlocuiți momeala degradată, infestată sau alterată

Repețați tratamentul atât timp cât constatați prezența rozătoarelor.



*exemplu de poziționare a locurilor de otrăvire

SEMNE ALE PREZENȚEI MURIDELOR

1 Excremente

Indică locul de infestație
Indică traseul lor și punctele principale de staționare/oprire
Dacă infestarea e mai veche.
Dau informații asupra speciei prezente și din câți indivizi este compusă colonia
Dacă sunt de mărime diferită indică faptul că sunt indivizi tineri și colonia este în creștere.



Șoarecele de casă
ASCUȚITE ÎNTRE 5-7 mm



Șobolanul negru
ASCUȚITE ÎNTRE 12-24 mm



Șobolanul gri
ROTUNJITE ÎNTRE 18-22 mm

3 Traseul



4 Pete de grăsime



5 Rozături asupra materialelor și ambalajelor



6 Observarea de animale vii sau moarte



7 Prezența găurilor și a cuiburilor



8 Miros specific



2 Urmele URMELE DE ȘOARECI (LUNGIME de circa 9,5 mm)



URMELE DE ȘOBOLAN (LUNGIME de circa 25 mm)



PENTRU COMBATEREA EFICACE A MURIDELOR:



1. **Inspectarea și verificarea**
Trebuie să știm ce specie sunt? Care este sursa lor de hrană? Unde au cuiburile? Traseul pe care îl parcurg de la adăpost spre sursa de hrană? Sunt colonii vechi sau nou venite? de unde au venit?



2. **Curățenia, asanarea și ordinea**
Acolo unde este posibil, faceți inaccesibilă sursa de hrană, crescând astfel eficacitatea momelii.



3. **Aplicarea metodelor de combatere**
Alegerea momelii sau capcanei potrivite în funcție de caz.



4. **Verificarea**
Momeliile sau capcanele vor fi verificate în mod regulat iar dacă momeala a fost consumată se realimentează după caz.



5. **Prevenirea**
O măsură bună este prevenirea reinfestării prin amplasarea în stații de intoxicare fixe a momelii pentru monitorizarea reapariției rozătoarelor.

LUPTA ÎMPOTRIVA ȘOARECILOR ȘI SOBOLANILOR PROBLEMA MURIDELOR INFESTANȚI

Cunoaște-ți dușmanul

Șobolanii și șoarecii din cauza multor boli ce le transmit și pagubelor ce le provoacă mediului, animalelor domestice și bunurilor, pot fi considerați ultimii mari dușmani din regnul animal pentru omul modern.

GREUTATE MEDIE:	200 - 500 g	150 - 250 g	12-25 g
LUNGIMEA DE LA CAP LA COADĂ:	18-25 cm	16-20 cm	6-9 cm
COADA:	15-21 cm	18-25 cm	7-10 cm
OCHII:	mici mari	mici	mici
BLANA:	este aspră și rară de culoare gri închis iar pe abdomen este gri deschis	este de culoare neagră iar în zona abdomenului este de culoare deschisă	spinare neagră gri-pe este de culoare cenușie pe spinare iar în zona abdomenului este mai deschisă
URECHI:	scurte și păroase	mari, cu puțin păr	aproape transparente
EXCREMENTE:	șimilare unor capsule fusiforme de 20 mm	până la 12 mm	ca niște baghete de 3-6 mm
DIETA ALIMENTARĂ:	omnivore, mănâncă până la 30 de g pe zi, în locuri puține	Până la 28 de g pe zi în mai multe locuri	mănâncă puțin și des până la 3 g pe zi în locuri foarte variate
ADĂPOST:	În crăpările pământului sapă vizuini și gauri subterane	sapă găuri subterane între pereți în special în spații înalte, mahsarde, hambare sau chiar copaci	în case, în crăpături, în camere
DURATA MEDIE DE VIAȚĂ:	de la 12 - 18 luni, până la maxim 4 ani	de la 12 - 18 luni, până la maxim 4 ani	de la 8 - 12 luni, până la maxim 2 ani
MATURITATEA SEXUALĂ:	3 luni	3 luni	după 5 săptămâni
PUI LA NAȘTERE:	3-7, maxim 12 pui	3-7, maxim 8 pui	5-7
NAȘTERI ÎNTR-UN AN:	până la 7	până la 6	până la 8

TEHNICI DE APLICARE A MOMELII

Șoarecii călăuză și arvicoli (familia Cricetidae, s.f. Microtinae): Arvicola terrestris, Microtus arvalis pallas, Pitymys savii De Sel etc, pot crea multe pagube culturilor agricole, și grădinilor. Se hrănesc în special cu părțile carnoase ale plantelor, în special cu tuberculii și bulbii sau rozând scoarța la inelele de la baza copacilor provocându-le moartea. Aproape toate speciile pot fi combătute cu momeli așezate în interiorul galeriilor.




ȘOARECI CALAUZA ȘI ARVICOLI

RATTUS NORVEGICUS SOBOLANUL GRI, SOBOLANUL DE CANAL, ȘOARECELE



RATTUS RATTUS SOBOLANUL NEGRU, ȘOARECELE DE MANSARDA



MUS MUSCULUS ȘOARECELE DOMESTIC



ÎMPOTRIVA ȘOBOLANULUI RATTUS NORVEGICUS

- Șobolanii mănâncă 20-30 de gr/zi de hrană uscată împărțită în mai multe mese.
- E mai bine să existe locuri cu momeală consistentă (dacă e posibil mai mult de 100 de g.) căci mai mulți șobolani trebuie să mănânce din acel loc.
- Au o rază de acțiune mai mare decât șoarecii.
- Este bine să plasați momeala la fiecare 4-15 metri.
- Atunci când au început să o consume mutați momeala sau vasul.
- Folosirea unei capcane creează inițial neîncredere, dar mai apoi se obișnuiesc.
- Șobolanii fac găurile afară, astfel încât trebuie să le găsiți intrarea întrarea
- Puneți momeala înăuntrul găurilor, dar nu le suprați pentru cel puțin 10 zile pentru a nu provoca abandonul lor.
- De asemenea se poate pune și în afara lor (pentru care cuburile parafinate pot fi o alegere corectă) apetitul nu este factorul critic.

ÎMPOTRIVA SOBOLANULUI RATUS RATUS

- Sunt adesea cel mai dificil de combătut.
- Pe căi suspendate, deci, e mult mai dificil să alegeți unde să poziționați corect punctele cu momeală.
- Trăiesc în interiorul clădirilor unde există mai multe surse de hrănire dificil de separat (apetitul devine factorul critic)
- Momeala trebuie plasată în mod special în locurile înalte.
- În cazul șobolanului negru este indicat să preveniți infestarea
- Folosirea unei capcane creează inițial neîncredere, dar mai apoi se obișnuiesc.
- Atunci când alte momeli nu funcționează soluția este momeala sub formă de cremă.

ÎMPOTRIVA ȘOARECELUI

- Șoarecii mănâncă 1-2 gr/zi împărțită în mai multe mese.
- E mai bine să creați mai multe puncte cu momeli cu gramaj redus decât mai puține puncte dar cu gramaj mai consistent.
- Numărul limitat de puncte cu momeală este prima cauză a insuccesului.
- Dacă este disponibilă hrana, ei se mișcă chiar mai puțin de 2-3 metri.
- Folosirea unei capcane mici de hrană le stimulează curiozitatea și facilitează consumul (dar intră și în cele ale șobolanilor).
- Dacă există șoareci iar momeala nu este atinsă mutarea ei în alt loc le stimulează curiozitatea.
- Șoarecii se mișcă pe 3 nivele (dați o privire atât deasupra cât și dedesubt).
- Momeliile cele mai eficiente împotriva țoarecilor sunt pasta, cerealele și granulele.

ANTICOAGULANȚII

Anticoagulanții au fost cotelura fundamentală în lupta împotriva muridelor. Motivul succesului lor e legat de întârzierea prin care se manifestă acțiunea lor, absența unui gust specific, la dozajul extrem de mic la folosire și de existența unui antidot specific. Anticoagulanții utilizati pentru producerea momelii rodenticide aparțin din punct de vedere chimic a doua categorii :cumarine și indandion. Mecanismul lor de acțiune e totuși similar: acționează la nivelul ficatului ca antagoniști a vitaminei K interferându-se cu sinteza factorilor de coagulare a sângelui Vitamina K– dependenți. Toxicitatea diferită a moleculelor anticoagulante e legată în mod special de capacitatea lor diferită de a fi degradate metabolic și îndepărtate odată cu fecalele sau urina. Acțiunea lor începe abia după 3 zile de la înghițire, provocând hemoragie internă ce slăbește animalul. Slăbirea face ca animalul să-și reducă activitatea sa și să rămână mai mult în adăpostul său. Vitamina K1 este antidotul specific pentru toți anticoagulanții.

N.B. Rapiditatea acțiunii anticoagulanților e foarte variabilă de la un minim de 2/3 zile la un maxim de 12/15 zile. Depinde mult de condiția fizică a subiectului, de cantitatea înghițită și de toxicitatea principiului activ.

PRINCIPII ACTIVE:

WARFARINA: Este primul anticoagulant introdus în comerț însă uzul său e deja rar ca și rodenticid dar e amplu folosit în medicină în terapiile anticoagulante.

CLOROFACINON: Anticoagulant cu doză multiplă din categoria indadionilor. Mai puțin toxic decât anticoagulanții din generația succesivă pentru că se conservă mai puțin în corpul animalului. Prezintă deci riscuri minore de otrăvire secundară pentru fauna sălbatică.

BROMADIOLON: Coumarină de generația a doua eficace după doar două înghițituri de momeală. Este principiul activ cel mai folosit în Europa. Este potrivit pentru dezinfectarea de toate muridele infectante.

DIFENACOU: E în mod general eficace după doar două înghituri de momeala. E un principiu activ cu o selectivitate între cele mai ridicate; rezultă a fi însă toxic asupra șoarecilor și șobolanilor și mai puțin asupra animalelor domestice.

BRODIFACOU: Un foarte puternic anticoagulant. Slăbește, precum alte principii active anticoagulante, dar odată înghițit are o capacitate de rezistență la degradare foarte mare, și deci chiar și o singură înghițitură este mortală asupra familiei muridelor rezistente la anticoagulanții actualmente cunoscuți. Cantitatea de momeală necesară pentru a obține cu Brodifacoum doza letală, este foarte mică, și corespunde cu mai puțin de 5% din consumul alimentar zilnic atât pentru șobolan cât și pentru șoarece.

TOXICITATEA ACUTĂ A MOMELILOR

În tabel este raportată valoarea toxicității momelii pentru o singură înghițură. Valorile sunt exprimate în DL50 ce corespund cantității de momeală în grame, care se administează pe cale orală într-o singură înghițură, duce la moartea a 50% din grupul de subiecți cu greutate medie. Valorile au fost calculate pornind de la date experimentale obținute pe baza principiilor activi puri.

DOZA LETALĂ PENTRU O SINGURĂ ÎNGHIȚTURĂ (DL50)

Exprimată în grame de momeală pentru subiecți de mărime medie

GREUTATEA MEDIE		Warfarin 0,025%	Clorofacinon 0,005%	Difenacoum 0,005%	Bromadiolon 0,005%	Brodifacoum 0,005%	Difetialon 0,0025%	Flocumafen 0,005%
Șobolan	250 g	186,0	102,5	9,0	5,6	1,3	5,6	1,3- 2,3
Șoarece	25 g	37,4	12,75	0,4	0,875	0,2	1,29	0,25-0,4
Animale non țintă								
Câine	15 Kg	1200-3000	/	15000	3000 DMT	45-1000	600 DMT	22-75
Pisică	3 Kg	72-480		6000	1500 DMT	1500	1920	600
Iepure	3 Kg	9600	3000	120	60	17,4	90	42
Porc	70 Kg	280		-	4200	700-2800	<2800	84000
Oale	50 Kg			100000		25000		5000
Pui	1,5 Kg	4800		1500	180-480	30-300	<60	3000

*Date nedisponibile – DMT= doza maximă tolerată

TOXICITATEA CRONICĂ A MOMELII

Toxicitatea unui principiu activ este în mod considerabil crescută dacă înghițitura devine repetată pe mai multe zile. În acest caz diferența de toxicitate dintre diferiții anticoagulați este considerabil mai mica, cu condiția ca subiectul sa nu fi dobândit rezistența la produs.

DOZA LETALĂ PENTRU MULTIPLE ÎNGHIȚTURI (DL50)

Exprimată în grame de momeală administrată pe 5 zile consecutiv pe subiecți de mărime medie.

GREUTATEA MEDIE		0,025%	-	Difenacoum 0,005%	Bromadiolon 0,005%	Brodifacoum 0,005%
Șobolan	250 g	0,44 g	0,80 g	0,44 g	0,35 g	0,30 g
Șoarece	25 g	*	*	0,04 g	*	0,02 g

*Date nedisponibile

TIPURI DE FORME




Pastă

Are o atracție mare și un uz practic de folosire rezolvând în totalitate problemele deratizării. Formula și conținutul înalt de grăsimi au și bune caracteristici de rezistență la umiditate.

Bucăți de pastă

Se găsesc în pungulițe de hârtie de filtru ce fac ușoară poziționarea și fixarea acestora și arată când a început consumul. Pot fi ușor îndepărtate la terminarea tratamentului.



Pastă în tăvițe

Studiate pentru a conserva mai bine apetibilitatea până la momentul consumului. În locurile de otrăvire în siguranță, forma lor face imposibilă transportarea lor și deci împrăștierea lor în mediu.



Cremă

Foarte apetisantă și ușor de aplicat Produsul, mângînd părul și labele, este înghițit de rozătoare în timpul curățării naturale, pe care șobolanii și șoarecii o fac. Înlocuiește în folosință vechile pulberi trasante, totuși fără a exista pericolul dispersării otrăvii prin intermediul curenților de aer din locurile de unde o contaminare generală poate fi extrem de periculoasă.



Capsule parafinate

Este forma de momeală cea mai rezistentă la umiditate. Forma caracteristică cu găuri permite fixarea lor pe o bucată de sârmă, pot fi coborâte în canale de inspecție ale rețelei canalizare, sau pe marginea apei. Pot fi fixate cu cui pe perete sau pe pământ. Având o apetibilitate moderată, e forma cu cea mai mare selectivitate împotriva lui Rattus norvegicus mai presus de toate celelalte animale. Datorită formei sale specifice este ușor de consumat.



Granule

Momeală compusă din cereale și alte componente alimentare foarte apetisante. Granulația îmbunătățește eficacitatea produsului diminuând risipirea lor. Forma fizică comprimată crește stabilitatea produsului și satisface necesitatea muridelor de a ronța.



Grăunțe de momeală

Toate rozătoarele mănâncă semințe de cereale. E eficace și economic. Este potrivit pentru uzul intern și extern în cadrul unei capcane sau înăuntrul unei găuri.

Grăunțe de momeală din ovăz

Prezența ovăzului crește apetibilitatea momelii.

APETIBILITATEA MOMELII

Trebuie precizat ca apetibilitatea momelii e un concept ce vine studiat în mod statistic. Depinde de disponibilitatea surselor de hrană alternative, de obiceiurile alimentare ale unei populații singulare, de presiunea demografică și de comportamentul social. TABEL INDICATIV CU PRIVIREA LA ATRACTIVITATEA MOMELII ÎN FUNCȚIE DE DIFERITE SPECII

FORMĂ	ȘOARECE	ȘOBOLAN DE CANAL	ȘOBOLAN DE MANSARDĂ	ȘOBOLAN DE APĂ	CĂINI	PĂSĂRI
Pastă	*****	*****	*****	*****	*****	*
Tablete	*****	*****	*****	*****	*****	**
Capsule parafinate	*****	**	**	**	**	
Amestec de fulgi cereale	*****	*****	*****	*****	*****	***
Grăunțe	*****	****	****	*****	*	*****
Grâu cu ovăz	*****	*****	*****	*****	*	*****
Cremă	*****	*****	*****	*****	*****	*

REZISTENȚA LA AGENȚII ATMOSFERICI

Momelile trebuie alese și în funcție de rezistența lor la agenții atmosferici

FORMĂ	REZISTENȚĂ LA UMIDITATE	REZISTENȚĂ LA SCUFUNDARE
Pastă	*****	**
Tablete	**	
Capsule parafinate	*****	*****
Amestec de fulgi cereale	*	
Grăunțe	***	*
Grâu cu ovăz	**	*
Cremă	*****	*****

MOMEALĂ DIN PASTĂ AROMATĂ
Înfășurate în hârtie de filtru,
sunt ușor de poziționat și permit
verificarea începerii consumului.
Pot fi ușor îndepărtate la terminarea
tratamentului. Formula are un conținut
ridicat de grăsimi iar învelișul de hârtie
ușurează și simplifică operațiunile
de poziționare. Ingestia unei singure
doze este suficientă în combaterea
rozătoarelor. Apetabilitatea
extraordinară care o exercită asupra
rozătoarelor asigură un control
simplu al infestării. În prezența
altor mâncăruri, s-a demonstrat că
rozătoarele preferă momeala pe bază
de aluat. Vebi a fost una dintre primele
companii din lume care a dezvoltat
această formulă. Din punct de vedere
al formulei, poate fi considerată cea
mai completă momeală.

Avantaje

- Atractivitate maximă mulțumită ingredientelor specifice de înaltă calitate selectate special pentru șoareci (*mus musculus*) și șobolani (*rattus rattus*, *rattus norvegicus*)
- Consistență perfectă care asigură atractivitate maximă
- Grăsimile selectate din compoziția momelii îi mențin aroma și suscită interesul rozătoarelor, sporind concomitent rezistența acestora la umiditate.
- Momeala garantează controlul infestării pentru circa 3-4 săptămâni, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare.

Utilizare

- Atât în spații interioare cât și exterioare.
- Recomandată mai ales în cazul infestațiilor care au ca obiect alimentele, datorită capacității sale extraordinare de a suscita interesul rozătoarelor în comparație cu alte produse.
- Se recomandă utilizarea stației de intoxicare în spațiile exterioare, pentru a asigura o protecție mai bună și o rezistență în timp a produsului.

BROMADIOLONE 0,005%

Vebitox

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



VEBITOX BROMA
PASTA cod. 65120
200 gr



UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



VEBITOX BROMA
PASTA
400 gr



PENTRU
UZ PROFESIONAL



VEBITOX BROMA
PASTA
5 kg



PASTĂ

MOMEALĂ SUB FORMĂ
DE BLOC PARAFINAT
Conține Bromadiolon, cel mai folosit
anticoagulant în lupta împotriva
șoarecilor și șobolanilor.
Se prezintă sub formă de cuburi
parafinați de 20 g, foarte rezistenți la
umezeală. Ușor de aplicat și poziționat
chiar și în locurile greu accesibile.
Ușor de îndepărtat după terminarea
tratamentului.
Recomandat în special în spații
exterioare cu umiditate ridicată.

Avantaje

- Formulă cu selectivitate îmbunătățită în ceea ce privește *rattus norvegicus* în comparație cu alte animale.
- Cea mai stabilă formulă de pe piață, rezistență mare la apă, umiditate și alte condiții de mediu speciale.
- Forma specifică facilitează consumarea momelii.
- Ușor de montat pe perete sau la sol cu ajutorul cuielor și imersie simplă în apa din fosele de colectare cu ajutorul unui fir de sârmă.
- Parafina protejează produsul împotriva apei, a mușcăturilor, bacteriilor și insectelor.

Utilizare

- Recomandat în special în spații exterioare cu umiditate ridicată.

BROMADIOLONE 0,005%

Vebitox

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



VEBITOX BROMA
BLOCK cod. 65108
200 gr



PENTRU
UZ PROFESIONAL



VEBITOX BROMA
BLOCK
5 kg



BLOC

MOMEALĂ GRANULE

Momeală realizată din cereale și alte alimente care suscită interesul rozătoarelor.

Procedul de granulare îmbunătățește eficacitatea produsului și reduce pierderile.

Forma fizică comprimată mărește stabilitatea produsului și satisface nevoia rozătorului de a ronța.

Avantaje

- Forma granulată sporește eficiența produsului și reduce pierderile.
- Forma fizică comprimată îmbunătățește stabilitatea produsului și satisface nevoia șoarecilor, șoarecilor de câmp și șobolanilor de a ronța.

BROMADIOLONE 0,005%

Vebitox



VEBITOX BROMA
GRANULE
200 gr



VEBITOX BROMA
GRANULE
400 gr



VEBITOX BROMA
GRANULE
5 kg



GRANULE

MOMEALĂ DIN CEREALE

Toate rozătoarele consumă cereale. Este o soluție eficientă și economică, care poate fi folosită în spații interioare sau exterioare cu ajutorul dozatoarelor sau direct în găurile făcute de șoareci. Momeală din cereale cu făină de ovăz. Făina de ovăz îmbunătățește savoarea momeii

Avantaje

- Formula din semințe/cereale este deosebit atractivă pentru orice tip de șoareci și șobolani.
- Conținutul de ovăz îmbunătățește savoarea momeii.
- Soluția perfectă pentru șoarecele de Câmp.

BROMADIOLONE 0,005%

Vebitox



VEBITOX BROMA
GRAU
100 gr

cod. 65111



VEBITOX BROMA
GRAU
250 gr

cod. 65112

GRAU

MOMEALĂ DIN PASTĂ AROMATĂ
Se prezintă sub formă de pastă având în compoziție grăsimi organice, ambalată în plicuri individuale de aproximativ 12.5 g, deosebit de atractivă pentru șoareci și șobolani de orice tip. Înfășurate în hârtie de filtru, sunt ușor de poziționat și permit verificarea începerii consumului. Pot fi ușor îndepărtate la terminarea tratamentului. Formula are un conținut ridicat de grăsimi iar învelișul de hârtie ușurează și simplifică operațiunile de poziționare. Apetabilitatea extraordinară care o exercită asupra rozătoarelor asigură un control simplu al infestării. În prezența altor mâncăruri, s-a demonstrat că rozătoarele preferă momeala pe bază de aluat. Vebi a fost una dintre primele companii din lume care a dezvoltat această formulă. Din punct de vedere al formulei, poate fi considerată cea mai completă momeală.

BRODIFACOUM 0,005%

Vebitox

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



**VEBITOX FACOUM
PASTA** cod. 65103
100 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



**VEBITOX FACOUM
PASTA** cod. 65104
250 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



**VEBITOX FACOUM
PASTA** cod. 65105
500 gr

UTILIZATORI
PROFESIONALI



**VEBITOX FACOUM
PASTA**
10 kg
cod. 65106

Avantaje

- Atractivitate maximă mulțumită ingredientelor specifice de înaltă calitate selectate special pentru șoareci (*mus musculus*) și șobolani (*rattus rattus*, *rattus norvegicus*)
- Consistență perfectă care asigură atractivitate maximă
- Grăsimile selectate din compoziția momelii îi mențin aroma și suscită interesul rozătoarelor, sporind concomitent rezistența acestora la umiditate.
- Momeala garantează controlul infestării pentru circa 3-4 săptămâni, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare.

Utilizare

- Atât în spații interioare cât și exterioare.
- Recomandată mai ales în cazul infestărilor care au ca obiect alimentele, datorită capacității sale extraordinare de a suscita interesul rozătoarelor în comparație cu alte produse.
- Se recomandă utilizarea stației de intoxicare în spațiile exterioare, pentru a asigura o protecție mai bună și o rezistență în timp a produsului

PASTĂ

PASTĂ

BRODIFACOUM 0,005%

MOMEALĂ GRANULE

Momeală din cereale cu făină de ovăz.
Făina de ovăz îmbunătățește
savoarea momelii.

VEBITOX FACOUM
GRANULE
200 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



Avantaje

- Se poate folosi atât în spațiile interioare cât și exterioare;
- Se poate folosi în toate situațiile, cu excepția zonelor cu umiditate ridicată;
- Se recomandă utilizarea stației de intoxicare în spațiile exterioare.



BIOCIDE

GRANULE

BRODIFACOUM 0,005%

MOMEALĂ SUB FORMĂ DE BLOC PARAFINAT

Cuburile parafinate de 20 g oferă un grad maxim de rezistență la condiții de mediu variate, menținându-și savoarea în timp. Ușor de aplicat și fixat, ușor de îndepărtat după folosire datorită formei. Este considerată cea mai stabilă formulă motiv pentru care este recomandată mai ales în medii umede sau cu umiditate ridicată.

VEBITOX FACOUM
BLOCK cod. 40108
250 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



Avantaje

- Formulă cu selectivitate îmbunătățită în ceea ce privește rattus norvegicus în comparație cu alte animale.
- Cea mai stabilă formulă de pe piață, rezistență mare la apă, umiditate și alte condiții de mediu speciale.
- Forma specifică a produsului facilitează consumarea momelii.
- Ușor de montat pe perete sau la sol cu ajutorul cuielor și imersie simplă în apa din fosele de colectare cu ajutorul unui fir de sârmă.
- Parafina protejează produsul împotriva apei, a mușcăturilor, bacteriilor și insectelor.



BIOCIDE

Utilizare

Recomandat în special în spații exterioare cu umiditate ridicată.

BLOC

STAȚII DE INTOXICARE STAȚII DE INTOXICARE STAȚII DE INTOXICARE



PETI - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOARECI

cod. 00928

Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 12,5 cm
Lățime: 9,5 cm
Înălțime: 4,3 cm

CARACTERISTICI:
• Din material plastic dur
• Poate fi dotată cu tije metalice pentru cuburile parafinate sau cu tăvi speciale din plastic.
• Închizătoare de siguranță cu cheie.




PRATICO - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOARECI

cod. 00915

Stație de intoxicare pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 11,5 cm
Lățime: 9,0 cm
Înălțime: 3,8 cm

CARACTERISTICI:
• Din material plastic turnat.
• Prevăzută cu compartiment lateral de hrănire pentru amplasarea.
• Închizătoare de siguranță



URBANO - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOBOLANI

cod. 00869

Stație de intoxicare din metal galvanizat cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 40,5 cm
Lățime: 7,8 cm
Înălțime: 9,0 cm

CARACTERISTICI:
• Stație de intoxicare pentru șoareci și șobolani.
• Uz exterior (grădini / zone urbane / fabrici / gropi de gunoi...)
• Echipată cu un sistem de închidere cu cheie, este practic inviolabilă.
• Conector special pentru fixarea la perete.



PRATICO - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOBOLANI

cod. 00921

Stație de intoxicare pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 25 cm
Lățime: 17,2 cm
Înălțime: 8,4 cm

CARACTERISTICI:
• Din material plastic turnat.
• Poate fi dotată cu tije metalice pentru cuburile parafinate sau cu tăvi speciale din plastic.
• Închizătoare de siguranță.




STAȚIE DE INTOXICARE NR. 1

cod. 01162

Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 22,0 cm
Lățime: 16,0 cm
Înălțime: 8,5 cm

CARACTERISTICI:
• Stație de intoxicare pentru șoareci și șobolani.
• Uz interior (magazine / birouri / restaurante / locuințe / ferme...)
• Uz exterior (grădini / zone urbane / fabrici / gropi de gunoi...)
• Echipată cu un sistem de închidere cu cheie, este practic inviolabilă.
• Conector special pentru fixarea la perete.



STAȚIE DE INTOXICARE NR. 2

cod. 01240

Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

DIMENSIUNI:
Lungime: 25,0 cm
Lățime: 11,5 cm
Înălțime: 8,0 cm

CARACTERISTICI:
• Accesibilă doar șoarecilor și șobolanilor.
• Prevăzută cu cheie antiintruziune.
• Poate fi reparată.
• Mai mult respect pentru mediul înconjurător, deoarece momeala nu este dispersată.
• Cel mai sigur sistem de exterminare a șobolanilor.
• Conformitate HACCP.
• Sistem de protecție împotriva ingestiei accidentale din partea copiilor, animalelor de companie și animalelor sălbatice.

CAPCANE CU ADEZIV VEBICOLLA

VEBICOLLA

cod. 00880

Lipici pentru șoareci non-toxic, incolor, inodor folosit pentru o ușoară capturare a șoarecilor și insectelor.



Vebicolla este un adeziv dens și lipicios non-toxic, neinflamabil, inodor și incolor care își păstrează calitățile timp îndelungat indiferent de condițiile de mediu și este ușor de folosit. Se aplică în strat de 3-4 mm pe un suport rigid (carton, lemn, pvc) cu o suprafață de minim 20x20 cm. Stratul de lipici se uniformizează singur.

Tub de 135g

KAPTA COLLA

cod. 00938

Lipici pentru șoareci non-toxic, incolor, inodor folosit pentru o ușoară capturare a șoarecilor și insectelor.



Kaptacolla este un adeziv dens și lipicios non-toxic, neinflamabil, inodor și incolor care își păstrează calitățile timp îndelungat indiferent de condițiile de mediu și este ușor de folosit. Se aplică în strat de 3-4 mm pe un suport rigid (carton, lemn, pvc) cu o suprafață de minim 20x20 cm. Stratul de lipici se uniformizează singur.

Tub de 135g



Draker®

PREZINTĂ URMĂTOARELE CARACTERISTICI

reduce frecvența tratamentelor

nu are efect iritant și coroziv

inodor

incolor

bună dispersabilitate în apă

nu obturează pulverizatoarele

DUBLĂ ACȚIUNE

Draker este un insecticid cu adevărat inovator, compus dintr-o fracțiune liberă și o fracțiune microîncapsulată, ce conferă insecticidului următoarele calități:

1

acțiune rapidă, efect repelent

2

efect non-repelent și acțiune insecticidă de lungă durată

ACȚIUNE INSTANTANEE

ACȚIUNE INSECTICIDĂ DE IMPACT ȘI EFECT REPELENT

În cazul insecticidului Draker, tetrametrina și piperonil butoxidul sunt compuși liberi cu disponibilitate imediată. Efectul inițial este distructiv, de îndepărtare și repelent, cu acțiune foarte rapidă și vizibilă.

Insecticidul Draker elimină și îndepărtează imediat insectele din zona de aplicare.

MICROCAPSULE

CIPERMETRINA ȘI O PARTE DIN PIPERONIL BUTOXID SE GĂDESC ÎN MICROCAPSULE, ADICĂ SUNT ACOPERITE DE UN FILM SUBȚIRE ȘI POROS DE POLIMER, CARE ARE URMĂTOARELE EFECTE:

Cipermetrina conținută în microcapsule este **protejată** împotriva degradării.




Membrana semipermeabilă care acoperă microcapsulele **împiedică** eliberarea substanței active atâta timp cât acestea se află în apă. Microcapsulele Draker devin active doar după ce soluția a fost pulverizată pe suprafața tratată. După pulverizare, apa se evaporă și substanța activă va fi eliberată gradual.



Microcapsulele își micșorează volumul până la **eliberarea** completă a substanțelor active.



DINAMICA FRAȚIUNILOR LIBERE ȘI MICROÎNCAPSULATE



INSECTICID SPECTRU LARG DE ACȚIUNE

INSECTE TĂRĂTOARE

FURNICI, COLEOPTERE: pe lângă efectul său imediat, Draker are și o acțiune indirectă deoarece insectele transportă microcapsulele în propriile cuiburi și adăposturi.

PURICI, CĂPUȘE, GÂNDACI ȘI PLOȘNIȚE DE PAT indicat pentru aplicarea în locuințe, adăposturi pentru animale, grajduri, grădini, gazoane și alte zone frecventate de animale infestate.

PĂIANJENI: tratamentul are un efect de lungă durată împotriva păianjenilor în zonele de aplicare.

PEȘTIȘORUL ARGINTIU, ACARIENI DE PRAF, INFESTĂRI PARAZITARE OCAZIONALE: aceste insecte se hrănesc cu praf și fragmente de materie organică care în amestec cu microcapsulele vor acționa prin ingerare.

INSECTE ZBURĂTOARE

ȚÂNTARI: Draker nu este fitotoxic și este foarte eficient pentru tratamentul gradurilor vii, a peluzelor, a adăposturilor, locurilor de aterizare și repaus a insectelor.

MUSTE: Ideal pentru tratamentul suprafețelor de aterizare și repaus.

VIȘPI: Foarte indicat pentru tratarea cuiburilor.

INSECTE CARE INFESTEAZĂ ALIMENTELE: Ideal pentru tratamentul suprafețelor de aterizare și repaus din depozite.

DOZAJ

MUSTE:

100-300 ml de soluție insecticidă la 10 litri de apă.

10 litri de soluție preparată sunt suficienți pentru tratarea unei suprafețe de 150-200 mp, în funcție de porozitate suprafețelor.

ALTE INSECTE:

50-200 ml de soluție insecticidă la 10 litri de apă.

10 litri de soluție preparată sunt suficienți pentru tratarea unei suprafețe de 150-200 mp, în funcție de porozitate suprafețelor.

Draker 10.2®



Insecticid concentrat microîncapsulat.
Efect rezidual de lungă durată pe orice suprafață.

• Eficacitatea și efectul rezidual al insecticidelor în emulsie pot fi reduce drastic în funcție de tipul de suprafață pe care sunt aplicate. Suprafețele poroase și absorbante vor reduce substanțial disponibilitatea substanțelor active. Insecticidul Draker este afectat într-o măsură mai mică de suprafața de aplicare, deoarece microcapsulele nu sunt absorbite de aceasta.

• Microcapsulele protejează substanțele active împotriva luminii, umidității și a temperaturilor ridicate, sporind eficacitatea produsului chiar și în condiții dificile așa cum se întâmplă adeseori, de exemplu atunci când este aplicat în câmp deschis sau pe suprafețe cu temperatură ridicată, umede sau uleioase.

• Rezultatele testelor arată că insecticidul Draker își poate păstra eficacitatea timp de până la 2 luni, chiar și atunci când este aplicat pe suprafețe poroase.

INODOR, INCOLOR, NU PĂTEAZĂ ȘI NU ARE ACȚIUNE COROZIVĂ
Insecticidul Draker nu conține solvenți, este pe bază de apă, nu are miros, nu pătează și nu are acțiune corozivă.

Compoziție

Cipermetrină 10 g
Tetrametrină 2 g
Piperonil butoxid 10 g

Apă și substanțe complementare în cantitatea necesară pentru 100 g produs



100 x 15ml

DRAKER 10.2
15 ml
cod. 65123



DRAKER 10.2
100 ml
cod. 65124



DRAKER 10.2
300 ml
cod. 65125



DRAKER 10.2
50 ml
cod. 65118



DRAKER 10.2
1 lt
cod. 65116

Utilizare

Locuințe, depozite, hoteluri, școli, spitale, clădiri publice, industrie alimentară, transport în comun, grajduri, garduri vii și peluze.

Draker RTU®



Insecticid lichid microîncapsulat
gata de utilizare.

DRAKER RTU este un insecticid lichid microîncapsulat gata de utilizare, cu efect îndelungat și spectru larg de acțiune.

Compoziție

Cipermetrină 0,30 g
Tetrametrină 0,06 g
Piperonil butoxid 0,30 g
co-formulanți q.s.p 100,00 g

MOD DE ACȚIUNE

• Acțiunea inițială a insecticidului Draker este asigurată de substanțele active libere. Efectul se produce insectele prezintă simptome de intoxicație după câteva minute, prin pierderea coordonării și a capacității de zbor sau de târâre.

• Insectele tind să părăsească zonele tratate și propriile cuiburi.

• Microcapsulele cu Cipermetrină nu au efect repelent, astfel încât, atunci când insectele se deplasează prin zona tratată, microcapsulele se vor atașa de picioarele, corpul, antenele și perii acestora.

Substanța activă va fi absorbită lent prin contact direct cu cuticula insectelor.

• Insectele se întorc la cuiburi sau adăposturi și microcapsulele vor fi transferate de la o insectă la alta prin simplul contact fizic, astfel încât insecticidul va avea efect și asupra insectelor care nu au avut contact direct cu zona tratată.

• Microcapsulele de dimensiuni reduse se amestecă cu praf și alte materii organice prezente în zona respectivă și vor fi ingerate de către insecte, provocând moartea acestora.



DRAKER RTU
400 ml
cod. 65117



SPECTRU DE COMBATERE

GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE,
FURNICI, MUSTE, ȚÂNTARI,
MOLII, CĂRĂBUȘI, DIPTERE,
ACARIENI DE PRAF ȘI INSECTE
ÎN GENERAL

UTILIZARE

Pentru uz domestic.
Recomandat pentru cuștile câinilor
și pisicilor.

OBSERVAȚII

efect insecticid de impact

efect insecticid rezidual

A se aplica în crăpături, fisuri și pe suprafețele de tranzit și staționare a insectelor.
A se agita bine înainte de folosire.

INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECT

Duracid

VIESPI

Jetul de soluție insecticidă ajunge la 4 metri distanță.

Compoziție

Cipermetrină 40/60 0,125 g
Tetrametrină 0,25 g
Piperonil butoxid 1,25 g

Formulă în soluție apoasă în cantitate suficientă pentru 100 g

Insecticid aerosol gata de utilizare pentru combaterea unei game largi de insecte, foarte eficient împotriva viespilor, fiind prevăzut cu aplicator special care facilitează tratarea obiectivului dorit.



DURACID VIESPI
750 ml
cod. 00582

SPECTRU DE COMBATERE	UTILIZARE	OBSERVAȚII
GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE, FURNICI, MUȘTE, CĂPUȘE, PLOȘNIȚE, CĂRĂBUȘI, TÂNTĂRI, MOLII, ACARIENI DE PRAF ȘI ALTE INSECTE	Pentru uz domestic și civil	efect insecticid de impact
		efect insecticid rezidual ..
		A se aplica în crăpături, fisuri și pe suprafețele de tranzit a insectelor.

Duracid

GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE ȘI FURNICI

Acțiune insecticidă, reziduală și repelentă puternică și eficientă. Eficient împotriva insectelor târătoare și zburătoare. Pulverizat în spații închise și pe suprafețe, garantează mai multe ore de protecție împotriva insectelor vizate. Recomandat pentru locuințe, spații domestice, pervazuri, uși, terase, etc.

Compoziție

Cipermetrină 40/60 0,125 g
Tetrametrină 0,25 g
Piperonil butoxid 1,25 g

Formulă în soluție apoasă în cantitate suficientă pentru 100 g

Insecticid aerosol gata pentru a fi folosit pentru combaterea insectelor, gândacilor de bucătărie, furnici, muște și țânțari.



DURACID GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE ȘI FURNICI
500 ml
cod. 00581

SPECTRU DE COMBATERE	UTILIZARE	OBSERVAȚII
GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE, FURNICI, MUȘTE, CĂPUȘE, PLOȘNIȚE, CĂRĂBUȘI, TÂNTĂRI, MOLII, ACARIENI DE PRAF ȘI ALTE INSECTE	Pentru uz domestic și civil	efect insecticid de impact
		efect insecticid rezidual
		A se aplica în crăpături, fisuri și pe suprafețele de tranzit a insectelor.

INSECTICID INSECTICID INSECTICID CAPCANE ECOLOGICE CU ADEZIV

Duracid Furnici

Insecticid piretroid granular gata pentru a fi folosit, cu efect de lungă durată și acțiune insecticidă.

DURACID FURNICI este o momeală insecticidă granulară cu conținut de zahăr, cu o formulă specială împotriva furnicilor. Produsul se caracterizează prin acțiune insecticidă deosebit de puternică și efect rezidual îndelungat, care va proteja zona tratată de infestații ulterioare.

MOMELI INSECTICIDE MICROGRANULARE CU ZAHĂR PENTRU FURNICI

Compoziție

Cipermetrină 0,600 g
Benzoat de denatoniu 0,001 g

Co-formulanți până la 100 g



DURACID FURNICI
100 gr
cod. 65119



DURACID FURNICI
150 gr
cod. 65115

Utilizare

DURACID FURNICI este recomandat pentru spații interioare și exterioare, la tratarea locuințelor (bucătării, beciuri, pervazuri, trotuare, etc.) și a grădinilor, spațiilor adiacente clădirilor împotriva cuiburilor de furnici vizibile la suprafață sau ascunse sub vegetație, zonelor adiacente locuinței sau spațiilor publice, cu scopul de a crea o barieră protectivă.

Duracid Praf

DURACID PRAF este un insecticid sub formă de praf recomandat pentru combaterea furnicilor, gândacilor de bucătărie, acarienilor, păduchilor, puricilor, acarienilor de praf, peștișorului argintiu, insectelor isopode și muștelor. Produsul se caracterizează prin acțiune insecticidă deosebit de puternică și efect rezidual îndelungat, care va proteja zona tratată de infestații ulterioare.

Compoziție

Cipermetrină 0,6 g
Benzoat de denatoniu 0,001 g

Co-formulanți până la 100 g

ACTIONEAZĂ PRIN CONTACT DIRECT

Insecticid piretroid sub formă de pudră gata pentru a fi folosit, cu un grad ridicat de combatere și efect de remanență.



DURACID PRAF
200 gr
cod. 65115

Vebicolla CAPCANĂ PENTRU MUȘTE



Capcană cu lipici non toxică.

VEBICOLLA CAPCANĂ PENTRU MUȘTE rezolvă problema muștelor într-un mod total ecologic și natural, datorită formulei sale fără aditivi chimici.

POLIBUTENĂ MIXTĂ ȘI POLIBUTENĂ FĂRĂ ADITIVI CHIMICI



VEBICOLLA CAPCANĂ PENTRU MUȘTE
6 bucati
cod. 00939



Aedex

Larvicid împotriva țânțarilor sub formă de comprimate efervescente

AEDEX este un larvicid sub formă de comprimate efervescente. Este deosebit de eficient împotriva tuturor speciilor de țânțari (inclusiv țânțarul tigru). Aedex acționează prin contact și ingestie, imitând efectul hormonului juvenil care inhibă transformarea larvei în stadiul adult. Dacă este folosit corect și în momentul potrivit, prezintă o anumită selectivitate față de prădători și hiperparaziți; este relativ inofensiv pentru celelalte specii de animale.

Compoziție

S-Metopren puț 0,500 g
Benzoat de denatoniu 0,001 g

Co-formulanți până la 100 g

DOZAJ :

În funcție de încărcătura organică din ape, dozajele recomandate sunt:

Pentru ape limpezi:

1 comprimat de 2 g la 1000/2000 l.

Pentru ape cu încărcătură organică puternică:

1 comprimat de 2 g la 500/1000 l.

Pentru spații închise cu încărcătură organică puternică precum tomberoanele:

1 comprimat de 2 g la 40 l.

A se aplica tratamentul în mod regulat din luna martie până în luna octombrie în zonele în care pot fi prezente larvele. A se repeta tratamentul la interval de 2-4 săptămâni în funcție de temperatura ambientală și nivelul de puritate al apei, precum și în caz de ploaie persistentă.



AEDEX
10x2 gr cod. 01126
10x5 gr cod. 01127

Instrucțiuni de folosire

Datorită formulei sale speciale sub formă de comprimate, Aedex este un produs sigur și ușor de utilizat. În lupta împotriva tuturor tipurilor de țânțari, este suficient a se distribui comprimatele în zonele în care se dezvoltă larvele, adică ape reziduale din tomberoane, fântâni, anvelope uzate, fose septice, guri de canal, guri de aerisire, epuratoare, fose de epurare, ape stătătoare cu suprafață redusă, gropi, bălți, canale și în general locurile în care se acumulează ape, etc.

REPELENȚI REPELENȚI REPELENȚI

REPELENT PENTRU CÂINI ȘI PISICI

Repelent lichid pe bază de uleiuri esențiale cu miros neplăcut pentru câini și pisici. Inofensiv pentru oameni și animale. Nu deteriorează suprafețele de aplicare. Schimbă în timp scurt obiceiurile proaste ale câinilor și pisicilor. Elimină obiceiul de a urina pentru marcarea teritoriului.

FORMULĂ Spray

Repelent cu acțiune îndelungată. Spray



REPELENT PENTRU CÂINI ȘI PISICI
750 ml
cod. 00839



REPELENT PENTRU CÂINI ȘI PISICI
750 ml
cod. 00840



REPELENT PENTRU CÂINI ȘI PISICI
1 kg
cod. 01023

REPELENT PENTRU PORUMBEI

Spray negazos pentru folosirea pe balcoane, terase, etc.

FORMULĂ Spray negazos



REPELENT PENTRU PORUMBEI
750 ml
cod. 00721

REPELENT PENTRU MISTREȚI ȘI ALTE ANIMALE SĂLBATICE

Menține la distanță mistreții, porcii spinoși și copitatele în general de drumuri publice, parcuri, grădini.



REPELENT PENTRU MISTREȚI ȘI ALTE ANIMALE SĂLBATICE
4 kg
cod. 01235

REPELENT PENTRU REPTILE

Granule pe bază de esențe naturale cu miros neplăcut pentru reptile precum șerpi, șopârle, etc.



REPELENT PENTRU REPTILE
750 ml



REPELENT PENTRU REPTILE
1 lt

REPELENT PENTRU CÂRȚIȚE

Produs natural sub formă de granule, ușor de aplicat și folosit pentru îndepărtarea cârțitelor din zona terenurilor și a grădinilor. Împrăștiati produsul uniform o dată pe lună pe întreaga suprafață destinată tratamentului. INTRODUCETI 4-5 CAPACE DE PRODUS ÎN INTERIORUL GALERIILOR ȘI ÎN PUNCTELE DE ACCES.



REPELENT PENTRU CÂRȚIȚE
250 ml
cod. 65114



REPELENT PENTRU CÂRȚIȚE
500 ml
cod. 65113



REPELENT PENTRU CÂRȚIȚE
1 lt
cod. 00720

REPELENT PENTRU CÂRȚIȚE SUB FORMĂ DE GEL

Amestec de uleiuri esențiale sub formă de gel, proiectat special pentru îndepărtarea cârțitelor și nutrienților pe căi naturale. Recomandat în mod special pentru terenuri cu umiditate ridicată. Ideal pentru terenuri cultivate, peluze, culturi de flori și grădini, cu acțiune protectivă de mai multe zile.



REPELENT CÂRȚIȚE SUB FORMĂ DE GEL
1 lt
cod. 01379


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Deschideți capacul și răsturnați produsul în tunelele și în găurile de acces vizate cu scopul de a crea o barieră protectivă.

REPELENT FUMIGEN

Fog Go Away combină uleiul de castor natural cu un vaporizator, pentru tratarea eficientă a galeriilor de cârțită, fiind în același timp un repelent activ împotriva insectelor dăunătoare (viespi) și animalelor sălbatice. Uleiul de castor formează o barieră fizică pe suprafața tratată a galeriilor, afectând sursele de hrană ale cârțitelor, determinându-le astfel să părăsească zona în căutarea unor noi surse de hrană.

Vapori repelenți pe bază de compuși naturali.



REPELENT FUMIGEN
27 gr
cod. 01236



S.C. FLOVY PROD-COM S.R.L.

Cluj-Napoca, Romania

Tel/Fax 0264/274118 Tel: 0745/191328

office@vebiromania.ro

www.vebiromania.ro

Vebi Istituto Biochimico
1 9 4 4

Vebi Istituto Biochimico srl - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco - Padova - Italy
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263 - www.vebiexport.com